

RIESGOS GENERALES Y EFECTOS SECUNDARIOS

Síndrome Postaborto (SPA)

El SPA se define como la reacción de estrés que se experimenta después de un aborto. SPA es una subcategoría del trastorno de estrés postraumático (TEPT). Los síntomas de SPA pueden incluir cualquiera de los siguientes: **culpa, ansiedad, entumecimiento, depresión, recuerdos y pensamientos suicidas.**

Efectos Secundarios Adicionales

Un estudio de mujeres estadounidenses que habían experimentado uno o más abortos indicó que se encontró que las siguientes reacciones estaban asociadas con el aborto.

Sentimientos de pérdida y tristeza: 55.8%

Temores sobre futuros embarazos: 36.9 %

Pesadillas: 30%

Retiro de la familia y amigas: 30%

Necesita ayuda para hacer frente a la pérdida: 29%

Aumento en el uso de drogas o alcohol: 26.7%

Dificultad en controlar la ira o enojo: 24%

Dificultad en dormir: 23%

La relación terminó con la pareja: 19.8%

Varios estudios han demostrado que el aborto aumenta el riesgo de que una mujer tenga un parto prematuro en futuros partos. Estos estudios también han demostrado un vínculo entre el aborto inducido y un mayor riesgo de cáncer de mama.

LA INVESTIGACIÓN

Glover V Fisk, NM **"Fetal pain: Implication for Research and Practice"**

Lanfranchi, Gentles, and Ring-Cassidy **"Abortion's Impact on Women"** 1st ed. Biology and epidemiology confirm the abortion-breast cancer link; p.109-142

Rue, Coleman, Rue, and Reardon **"Induced Abortion and Traumatic Stress"**
<https://medscimonit.com/download/index/idArt/11784>

Babbel **"Post Abortion Stress Syndrome (PASS) - Does It Exist?"** <https://www.psychologytoday.com/us/blog/somatic-psychology/201010/post-abortion-stress-syndrome-pass-does-it-exist>

Anderson **"Abortion and the Risk of Breast Cancer: Information for the Adolescent Woman and Her Parents"** <https://acpeds.org/position-statements/reproductive-choices-of-young-women-affecting-future-breast-cancer-risk>

<https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-providers/mifeprex-mifepristone-information>

https://www.babycenter.com/pregnancy/your-baby/fetal-development-week-by-week_10406730

Descargo de responsabilidad: esta hoja de datos está diseñada para ser solo una herramienta informativa. No está destinado a brindar asesoramiento médico ni a reemplazar la atención de un médico calificado



830-456-8840

103 Industrial Loop Ste. 900
Fredericksburg, Texas



SUS OPCIONES

EL ABORTO

La Mejor Decisión
es una Decisión Informada

DENTRO DE LAS 10 SEMANAS POSTERIORES A LA FUM *

RU-486 (píldora abortiva)

*El régimen aprobado por la FDA es un proceso de dos visitas que involucra dos medicamentos diferentes

El Mifeprex se administra por vía oral durante una visita al consultorio. Mifeprex bloquea la progesterona, interrumpiendo el desarrollo del embarazo y provocando el desprendimiento del embrión plantado.

El Misoprostol se toma en casa 24 a 48 horas después. El misoprostol induce contracciones para vaciar el útero. Se realiza una cita de seguimiento para asegurarse de que el aborto se haya completado.

Advertencia: La FDA ha aprobado el uso de Mifeprex solo hasta 70 días (10 días) a partir de la FUM. Las desviaciones del régimen aprobado aumentan el riesgo de complicaciones dañinas.

No compre Mifeprex a través de Internet porque pasará por alto ciertas medidas de seguridad diseñadas para proteger su salud. Mifeprex tiene restricciones de seguridad especiales sobre cómo se distribuye al público. Además, los medicamentos comprados en fuentes extranjeras de Internet no son la versión aprobada por la FDA y no están sujetos al control de fabricación ni a las inspecciones de calidad de la FDA.

Riesgos y Efectos Secundarios

- 8-10% de fracaso de las píldoras, lo que requiere un aborto quirúrgico para completar la terminación.
- Hemorragia (no detener el sangrado), calambres, náuseas, vómitos, diarrea, infección.
- No se recomienda para mujeres con anemia, trastornos hemorrágicos, enfermedad hepática o renal, trastorno convulsivo, trastorno intestinal inflamatorio agudo, que tengan un DIU o que no puedan regresar para la próxima visita.

Desarrollo fetal FUM- 10 semanas

- El corazón empieza a latir
- Comienzan a desarrollarse el cerebro, la médula espinal y los nervios
- La cara toma forma con ojos, orejas, nariz y labio superior
- Todas las extremidades se forman con huesos junto con los dedos de las manos y los pies
- Se están formando los órganos reproductores internos
- Se están formando conexiones cerebrales
- Empieza movimiento

* **Fecha de la última menstruación**

6-16 SEMANAS Y 6 DÍAS DESPUÉS DEL FUM

Legrado por aspiración o aspiración por vacío

- La paciente se acostará boca arriba con los pies en estribos y se insertará un espéculo para abrir la vagina.
- Se administra un anestésico local en el cuello uterino. La mayoría de las mujeres sienten algo de dolor, como fuertes calambres menstruales durante el procedimiento. Se usa un tenáculo (un gancho delgado y puntiagudo unido a un mango que se usa para sujetar y agarrar tejido en cirugías) para mantener el cuello uterino en el lugar que se va a dilatar. El cuello uterino se abre colocando y extrayendo varillas de metal que abrirán el cuello uterino la cantidad exacta necesaria.
- Cuando el cuello uterino está lo suficientemente abierto, se inserta en el útero una cánula (un tubo de plástico largo) conectado a una máquina de succión para succionar el feto y la placenta.
- El procedimiento suele durar de 10 a 15 minutos, pero es posible que sea necesario quedar en la clínica durante unas horas para ser observado por cualquier complicación.

Riesgos y Efectos Secundarios

- Calambres, náuseas, sensación de desmayo, cicatrización del revestimiento del útero.
- Los efectos secundarios menos frecuentes son: hemorragia, coágulos de sangre, daño en el cuello uterino, perforación (hacer un agujero) a través del útero.
- Enfermedad pélvica inflamatoria causada por una ETS no tratada o una bacteria introducida en el útero. Puede ser asintomático o causar fiebre, dolor, sensibilidad abdominal y posible infertilidad.

Desarrollo fetal 10 semanas a 16 semanas y 6 días

- Perfil bien definido
- Ojos están abiertos
- Las crestas de las huellas dactilares comienzan a formarse por la fricción del tacto
- Se desarrollan uñas e iris en los ojos
- Se están formando los genitales externos
- Los riñones producen orina y se forman los dientes

El 80% de todos los abortos espontáneos ocurren en las primeras 12 semanas de embarazo.

17-20 SEMANAS Y 6 DÍAS DESPUÉS DEL FUM

Dilatación y evacuación

- A menudo, 24 horas antes del procedimiento, el proveedor del aborto insertará laminaria o dilatador sintético dentro del cuello uterino de la paciente.
 - Las varillas en forma de cono, que aumentan de tamaño, se utilizan para dilatar el cuello uterino.
 - Se inserta una cánula para comenzar a retirar el tejido del revestimiento. Luego, se puede usar una cureta para raspar cualquier tejido residual.
 - Si es necesario, se utilizan fórceps para extraer tejido más grande.
 - El procedimiento suele durar aproximadamente 30 minutos.
- ### Riesgos y Efectos Secundarios
- Pueden ocurrir náuseas, sangrado, calambres y mareos durante las dos semanas posteriores al procedimiento.
 - Enfermedad pélvica inflamatoria causada por una ETS no tratada o una bacteria introducida en el útero. Puede ser asintomático o causar fiebre, dolor, sensibilidad abdominal y posible infertilidad.
 - Infección por tejido remanente en el útero.
 - Aunque son poco frecuentes, los riesgos adicionales son: daño al revestimiento del útero o al cuello uterino, perforación (hacer un agujero) del útero, coágulos de sangre y sepsis (infecciones que ingresan a la sangre).

Desarrollo fetal 17-20 semanas y 6 días

- Tragar y chupar
- Las articulaciones se desarrollan y los aleteos se convierten en patadas y golpes
- Cejas y labios completamente formados
- Se están desarrollando los sentidos, como el olfato, la visión, el tacto / dolor, el gusto y el oído (incluido el oír su voz)
- Empiezas a sentir movimiento

“DADA LA EVIDENCIA ANATÓMICA, ES POSIBLE QUE EL FETO PUEDA SENTIR DOLOR A PARTIR DE LAS 20 SEMANAS Y SE LE CAUSE ANGUSTIA POR LAS INTERVENCIONES A PARTIR DE LAS 15 O 16 SEMANAS.”